JAうご「米」生産基準　農薬リストNo，2

管理	分類	農薬名	商品番号			使用量	使用時期・期限	使用回数	使用目的	使用月日	使用月日	使用月日
本田管理	殺菌剤	オリゼメート粒剤	2	0	5	3kg/10a	6月15～20日	2	いもち病			
		オリブライト粒剤	2	0	7	1kg/10a	6月20～25日	1				
		コラトップ粒剤	2	1	7	3～4kg/10a	出穂15～7日前まで	2				
		ラブサイド粉剤	2	7	1	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー21日前まで	4				
		ラブサイドフロアブル	2	6	8	液剤　1000倍液　100～150L	収穫ー21日前まで	4				
		ビーム粉剤	2	3	9	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー21日前まで	3				
		ビームゾル	2	3	6	液剤　1000倍液　100～150L	収穫ー21日前まで	3				
		カスラブサイド粉剤	2	1	2	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー21日前まで	4				
		カスラブサイドゾル	2	1	0	液剤　1000倍液　100～150L	収穫ー21日前まで	4				
		ブラシン粉剤	2	5	3	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー21日前まで	2				
		ブラシンフロアブル	2	5	2	液剤　1000倍液　100～150L	収穫ー21日前まで	2				
		モンセレン粉剤	2	6	5	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー21日前まで	4	もんがれ病			
		モンセレンフロアブル	2	6	4	液剤1500倍液　150L	収穫ー21日前まで	4				
		モンカットファイン粉剤	2	5	8	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー14日前まで	3				
		Zボルドー	2	0	2	粉剤　3～4kg/10a	出穂20～10日前まで	1	稲こうじ病			
		ラブサイドベフラン	2	6	9			3				
	殺虫剤	オフナックバッサ粉剤	1	1	0	3～4kg/10a	出穂前まで	1	イナゴ			
		スミバッサ粉剤	1	2	8	3～4kg/10a	収穫ー14日前まで	4	カメムシ他			
		スミバッサ乳剤	1	2	6	1000倍　100～150L/10a	収穫ー21日前まで	4				
		トレボン粉剤	1	3	4	3～4kg/10a	収穫ー7日前まで	3				
		トレボンEW	1	3	2	1000倍　150L/10a	収穫ー21日前まで	3				
		トレボン乳剤	1	3	3	2000倍　150L/10a	収穫ー21日前まで	3				
		バイジット粉剤	1	3	7	3～4kg/10a	収穫ー21日前まで	2				
		スタークル粉剤	1	2	2	3kg/10a	収穫ー 7日前まで	3				
		スタークル粒剤	1	2	3	3kg/10a	収穫ー 7日前まで	1				
	混合剤	ラブサイドトレボン	3	4	4	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー21日前まで	3	いもち・虫ほか			
		モンラブトレボン	3	3	6	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー21日前まで	3				
		ラブサイドスミチオン	3	4	0	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー21日前まで	3				
		カスラブスミバッサ	3	0	9	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー21日前まで	3				
		ラブサイドスタークル	3	1	1	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー21日前まで	3				
		モンガリット粒剤	3	1	2	粉剤　3～4kg/10a	収穫ー45日前まで	2				
	倒伏軽減剤	ロミカ粒剤	5	0	6	2～3kg/10a	出穂25～10日前まで	1	倒伏軽減			
		スマレクト粒剤	5	0	1	2～3kg/10a	出穂10～5日前まで	1				
		ヒビフル粉剤	5	0	5	3～4kg/10a	出穂10～5日前まで	1				
		ヒビフルフロアブル	5	0	4	100cc/10a　50～100L	出穂10～2日前まで	1				
	ラジコン防除	ラブサイドモンガードゾル	4	8	1	800ml/10a	7月25～27日予定		いもち病・もんがれ病			
		ビームエイトスタークルゾル	4	8	2	800ml/10a	8月8～10日予定		いもち病・カメ虫			
		ラブサイドダントツフロアブル	4	8	3	800ml/10a	8月22～24日予定		いもち病・カメ虫			

注意　上記農薬リスト以外の品目については、空欄にご記入ください。（登録農薬に限ります）